



Informasjon til LAR-pasienter og rusmiddelbrukere fra Helsedirektoratet og Statens Legemiddelverk

## Stopper salget av Metadon Martindale mikstur

Statens legemiddelverk stopper salget av Metadon Martindale mikstur fra 8.april 2014 fordi det er mistanke om at feil bruk kan gi alvorlig helseskade. Legemidlet inneholder store mengder av hjelpestoffet povidon som er ufarlig når miksturen drikkes, men svært skadelig dersom den injiseres. Vi vet at noen rusmiddelbrukere / LAR pasienter gjør dette.

**Metadon Martindale er trygt når det brukes som anbefalt av legen, men kan gi alvorlige organskader dersom det settes med sprøyte**

- Pasienter som har brukt Metadon Martindale mikstur vil nå få en annen metadonmikstur som ikke inneholder povidon.
- Dersom du har injisert Metadon Martindale mikstur, snakk med legen din eller med den kommunale oppfølgingstjenesten du er i kontakt med. Du kan også kontakte andre hjelpeinstanser du kjenner til eller får hjelp fra.
- Kjenner du noen som har injisert Metadon Martindale mikstur, be dem snakke med legen sin eller andre hjelpeinstanser.
- Har du spørsmål, kan du ringe nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) på tlf:800 49 512
- Kontakt gjerne brukerorganisasjonene på rusfeltet

### Om povidon:

Povidon er et vanlig hjelpestoff som også finnes i en rekke andre legemidler, som Subutex, Buprenorphine Orifarm, Suboxone Temgesic, Apocillin, Pinex, Napren-E og Voltaren. Innholdet av povidon i disse legemidlene er betydelig lavere enn i Metadon Martindale mikstur. Povidon suges ikke opp fra munn eller tarm og skilles ut med avføring. Hjelpestoffet povidon er derfor ufarlig når legemiddelene brukes riktig.

Når Metadon Martindale settes med sprøyte kan opphopning av povidon i kroppen føre til skade på skjelettet, beinmargen, nyrene, tarmen, leveren og hjertet. Risikoen for skader øker med antall injeksjoner.

*Fortsetter på baksiden*

### **Tegn på povidonforgiftning**

- Generelle sykdomstegn som slapphet, redusert matlyst og vekttap
- Magesmerter
- Brudd i armer, bein eller andre deler av skjelettet
- Blodprøver kan vise lav blodprosent og redusert nyrefunksjon

### **Spesielt for LAR-pasienter**

Bruk av medikamentene metadon og buprenorfin i LAR-behandling gir nedsatt risiko for å dø av overdose. Det er viktig at du ikke slutter å ta LAR-medisinene dine.

### **OPPSUMMERING:**

- Det er ikke skadelig å drikke Metadon Martindale mikstur
- Pasienter som har brukt Metadon Martindale mikstur vil få et likeverdig metadonpreparat som ikke inneholder povidon. Dette preparatet skal også drikkes.
- Ingen tablett eller miksturer skal injiseres
- Dersom du har injisert Metadon Martindale mikstur, snakk med legen din eller med den kommunale oppfølgingstjenesten du er i kontakt med. Du kan også kontakte brukerorganisasjonene på rusfeltet.
- For mer informasjon kan du ringe Nasjonal kompetansetjeneste for TSB på tlf 800 49 512